

Vermeidung von Neuinfektionen Euter Entzündung

Der wichtigste Faktor im Falle von Neuinfektionen von Mastitis ist die Konzentration ob Erregern bei der Zitzen Öffnung, rund um den Zitzenkanal. (Mein 2004)

Das heißt, wie mehr Erkrankungserregern beim Zitzenkanal sind, wie mehr Neuinfektionen in ihre Herde.

Der Infektion Erreger nutzt also den Zitzenkanal als eintritt Pforte.

Viele Erregern kommen im Stall Bereich an der Zitze, nicht nur im Liegebox aber auch im verschmutzt laubereich von die Kühe, Durch Z.B. Klauenverschmutzung.

Bei melken hat man die Chance, durch eine gute vormelkpraxis die Zitzen gut zu reinigen und desinfizieren, und so die Erregern zu löschen.

Macht man das nicht dann können die Keimen weiter im Zitzenkanal kommen und einen Euter Entzündung verursachen . Aber die Keimen kommen auch im Zitzengummi und so wieder andere Kühe infizieren.

Im Trockenstand wann die Zitzen nicht gereinigt werden, hat man auch mehr Neuinfektionen, deswegen ist Zitzen Versiegelung im trockenstand so wichtig. Trotzdem sollte es eine gute Praxis sein die Kühe in der Anfang und am Ende vom der trocken stand noch einmal pro Tag zu dippem.

Vormelken mit einem Vordip- oder Schaummittel die eine gute Erregern abtötende Wirkung hat, dann die ganze Zitze, auch die Zitze spitze, rund um den Zitzenkanal gut reinigen.

Oder mit einer Zitzenbürsten Maschine für die Zitzen zu reinigen und desinfizieren.

Bluemax Premium mit Chordioxide oder Hexifoam mit Chlorhexidine.(www.dairyshop.de)

Puli-sistem Reinigen und Desinfizieren

[YouTube teatscrubber Video](#) link on website

